


# 大動脈解離とは？

大動脈解離は動脈硬化により、しなやかさを失った血管壁に亀裂が入り、血管の内膜と外膜の間に血液が流れ込むことで大動脈が拡大していき、破裂した場合、死に至る病気です。

大動脈解離は大動脈壁の亀裂部位によってA型とB型に分けることができます。

A型：心臓に近い部位が解離……手術で救命

B型：心臓から遠い部位の解離……薬で治療




今回はB型大動脈解離について説明します。

## ● B型大動脈解離

下行大動脈に解離のある病態

高血圧のままいると大動脈の解離が拡大し、破裂、死亡するリスクが高まります。退院後も血圧管理をおろそかにすると再発します。



**血圧管理が大事です！**

**目標血圧 130/80 mmHg未満**

**を目標にしましょう!!**

2020年改訂版 大動脈瘤・大動脈解離診療ガイドラインより

血圧管理のためには薬を正しく服用することが大切です。

あなたの薬は何個でしょうか？ 飲んでいる薬を数えてみましょう。

( 年 月 日 )

	朝	昼	夕	眠前
食前				
食後				

1つ1つの薬の効果等については【お薬の説明書】をご覧ください。  
薬について気になることがありましたら薬剤師にご相談ください。

