

# 家庭内の事故～こんな時どうします？

私たちの身の回りにある洗剤、化粧品、乾燥剤、殺虫剤、園芸用品、医薬品などは、すべて中毒事故をひきおこす原因となります。しかし、その危険性については無防備であり、取扱いの誤りや、乳児・幼児がまちがって飲んだりする事故が後を絶ちません。

以下にその危険性と緊急時の対応について簡単に説明します。

商品名（例）	毒性	対応
漂白剤＜塩素系＞ 次亜塩素酸ナトリウムを含む  キッチンハイター、ハイター、ブライト、カビとり剤など	原液や粉末を口にしたら、危険。皮膚、粘膜がただれる。うすめたものでも、注意が必要。  塩素系の方が、毒性強い。	少しでも飲んだら、吐かせないで、牛乳をコップ半分程度飲ませ、口の中をよく洗った後で診てもらってください。目に入った時は、15分以上流水で洗った後にすぐに眼科医に診てもらってください。
漂白剤＜酸素系＞  キッチンワイドハイター、ワイドハイター、カラーブライトなど	原液や粉末を口にしたら、注意。大量でなければ、あまり問題なし。	少しでも飲んだら、吐かせないで、牛乳をコップ半分程度飲ませ、口の中をよく洗った後で診てもらってください。目に入った時は、15分以上流水で洗った後にすぐに眼科医に診てもらってください。
ホウ酸、ゴキブリダンゴ	大人：ホウ酸1～3gで中毒症状が出てくる可能性あり。ホウ酸の含有量によって違いますが、市販の商品の場合、子供では、1／4個以上食べていると中毒の危険あり。	食べた場合、水か牛乳を飲ませ、できれば、吐かせてから受診してください。
タバコ	食べた場合は、要注意。吸いがらの浸った水を飲んだ時は、危険。	症状（嘔吐、下痢、唾液増加など）は、30分～4時間以内に現われます。すぐに吐き出させてください。その際、水やミルクを飲ませてはいけません。すぐに受診してください。体内に入ったニコチンは、24時間経つと体の外に出してしまうので、1日経っても異常がなければ、もう心配いりません。
シリカゲル	消化管から吸収されないので、ほとんど毒性はありません。まれに口の中がただれることがあります。	コップ半分くらいの水分を飲ませ、様子を見ます。
生石灰 せんべいや、のりなどの乾燥剤	触れると熱が発生するので口の中やのどや食道など触れた部分にやけどを起こす恐れあり。目に入ると痛みやただれを起こし、失明する事もあり。	少量でも食べた場合、口の中をよく洗い、うがいをさせます。牛乳を飲ませ、受診させてください。吐かせてはいけません。
口紅	子供が誤って食べる量では、ほとんど問題なし。	水分をとらせて、様子を見ます。



商品名(例)	毒性	対応
マニキュア液、 マニキュア除光液	少量でも飲んだり、誤って気管に入ると危険。	吐かせてはいけません。少量でも飲んだ場合は、すぐに受診して下さい。
ボタン型電池 カメラ、電卓、補聴器、ゲームなどに汎用されている。  <電池の種類> アルカリマンガン電池、水銀電池、酸化銀電池、リチウム電池など	食道や胃の粘膜を腐食したり穿孔する(穴があく)場合あり。	飲んだ場合、すぐに受診して下さい。受診時に電池の種類を伝えて(同じ種類の電池があれば、持参)ください。飲んだ事が確かでも確認のために受診して下さい。電池は、レントゲンに写ります。
灯油 ベンジン ガソリン	飲んだり、吐いたりした時、気管に入ると肺炎の危険あり。 飲んだ場合、口の中や喉、胃のあたりが熱くなり、吐き気、嘔吐、下痢などの症状。	飲んだ様子があれば、吐かせないですぐに受診して下さい。 目に入った場合は、すぐに流水で15分以上洗眼し、それでも痛みや赤みがあるなら眼科受診を。 皮膚についたら、石鹸で洗う。
シャンプー	少量を口にした程度では重い中毒の可能性は少ない。	牛乳を飲ませ、様子を見ます。目に入った場合は、流水で洗浄。
シャボン玉液	毒性は低い。	牛乳を飲ませ、様子を見ます。目に入った場合は、流水で洗浄。



## 事故を未然に防ぐために

- ★ 薬、化粧品、洗剤、農薬、たばこ等は、子供の手の届かないところに置くようにしてください。
- ★ 洗剤、農薬等をジュースや牛乳などの空き瓶に入れないようにしてください。
- ★ 灰皿がわりに使ったジュースやビールの空き缶に残っていた液を飲んでしまう事故も多いようです。
- ★ 冷蔵庫の中に食品以外のものを入れる時は、はっきりとわかるように表示しましょう。

## のんでしまったら

すぐ吐かせた方がよい場合と、吐かせない方がよい場合があります。どうしたら良いかわからない時は、必ず飲んだもの(容器や説明書)を手に持って、医療機関を受診しましょう。



商品や毒性の情報が必要なおときには大阪中毒110番まで。

072-727-2499 24時間、年中無休