

TS-1+高用量CDDP療法 (ティーエスワン+シスプラチン療法)

●点滴スケジュール

8日目

ボトルの内容

点滴時間

ソルデム3A

約1時間

ソルデム3A
フロセミド

約1時間

グラニセトロン
デキサート

約30分

ソルデム3A
フロセミド

約1時間

ソルデム3A

約1時間

シスプラチン

約2時間

イメドカプセル(吐き気止め)
1Capを点滴前に服用します。

同時に点滴

1~21日目

ティーエスワン

内服

同時に点滴

9、10日目

経口補水液OS-1
500mL×2本を2日間摂取します。
(水分・電解質補給、腎毒性軽減)

●お薬の内容

・ティーエスワン

抗がん剤です。骨髄抑制、食欲不振、吐き気・嘔吐、下痢、口内炎等が現れることがあります。

・ソルデム3A

体の水分と電解質を補うお薬です。

・フロセミド

利尿剤です。尿の量を多くし、シスプラチンの副作用である腎毒性を軽減します。

・グラニセトロン

抗がん剤による吐き気や嘔吐を抑えます。

・デキサート

抗がん剤によるアレルギー反応を防ぎます。吐き気や嘔吐を抑える効果もあります。

・シスプラチン

抗がん剤です。吐き気・嘔吐、食欲不振、全身倦怠感、脱毛、骨髄抑制等が現れることがあります。

原則として、5週間ごとに行います。